

Belkar™

Arylex™ active

HERBITSIID

Metazamix™

HERBITSIID

BELKAR™ ja METAZAMIX™- teel täiuslikkuse poole!

Talirapsi külv on kohe käes, ja seos sellega päevakorras ka dilemma, millega teostada umbrohutõrjet. Oluline on, et väike rapsitaim ei peaks konkureerima umbrohtudega valguse ja toitainete pärast ning saaks jõudsalt kasvada ja areneda. Heas kasvujõus, tugev taim on talvekindlam ja vastupidavam ka kevdistele äärmuslikele ilmastikuoludele.

Corteva Agriscience soovib talirapsil kasutada üheks lahenduseks herbitsiidi BELKAR™. Herbitsiidis sisaldub kaks toimeainet: Arylex™ Active ja pikloraam. BELKAR™-it võib kasutada soolotootena või teise suurepärase lahendusena segada herbitsiidiga METAZAMIX™. Lisades BELKAR™-ile juurde METAZAMIX™-i laiendate herbitsiidi tõrjespektrit veel lisaks kahe toimeaine, aminopüraliidi ja metasakloori võrra. Tulemuseks on kõige laiema spektriga umbrohutõrjesegu. Kasutades herbitsiide segus oleksid kulunormid vastavad, 0,25 l/ha BELKAR™, millele on lisatud 0,6- 0,8 l/ha METAZAMIX™. Tootesegu on mõeldud kasutamiseks 1 kord hooajal.

BELKAR™ ja METAZAMIX™ herbitsiidisegu eelised:

- Tõrjub peamisi enamlevinud laialehelisi umbrohtusid nt kukemagun, rukkiilil, kesalil, malts, roomav madar e. vim, verev iminõges, jne.
- Umbrohutõrje efektiivsus ei sõltu mulla tüübist ega niiskusest, kuna segus sisalduvast 4 erinevast toimeainest 3 on kontaktse toimega.
- Tänu peamiselt kontaktsele toimele, ei sõltu tõrjeefektiivsus ka mullaharimise viisist. Ebaühtlaselt haritud ja veidi paakunud muld ei mõjuta oluliselt toimeefektiivsust.
- On võimalik kasutada ka otsekülvi korral, oluline, et töötlemise hetkel on umbrohud tärganud.
- Kiire toime, visuaalne efekt on märgatav juba 24 tunni möödudes pärast pritsimist.
- Pärssib ka ristõielisi umbrohtusid.

Kasutades BELKAR™-it või segus koos METAZAMIX™- iga on oluline järgida mõningaid nüansse:

- Kui põllus on probleeme varisega või kõreliste umbrohtudega on väga oluline ka need tõrjuda, kuid BELKAR™ ja METAZAMIX™-iga kõreliste herbitsiidi kokku segada ei tohi. Intervall kahe pritsimise vahel peaks olema 7 päeva.
- BELKAR™ ja METAZAMIX™-i võib kasutada alates rapsi 3 pärislehe faasist, oluline et vähemalt 90 % taimikust oleks saavutanud vastava kasvufaasi.
- Kuna segus sisalduvad 3 toimeainet on kontaktseid ja üks mullatoimeline, siis parima tulemuse saavutamiseks on oluline jälgida, et umbrohud oleks pritsimise hetkeks tärganud.
- BELKAR™ ja METAZAMIX™-i ei tohi kasutada samas segus kasvuregulaatorite, ega fungitsiididega. Intervall kahe pritsimise vahel peaks olema 7 päeva.
- BELKAR™ ja METAZAMIX™-i ei tohi kasutada segus kõrge kontsentratsiooniga booriga.
- BELKAR™ ja METAZAMIX™-ile ei tohi lisada märgajat.

BELKAR™-it saab kasutada ka üksi, jaotatult pritsides. Esimene pritsimine tehakse rapsile 3-4 pärislehe faasis kasutades normi 0,25L/ha, teist korda pritsitakse rapsi 6 pärislehe faasis, siis on norm sama 0,25 l/ha. BELKAR™-it saab kasutada ka ühekordse pritsimisena rapsi hilisemas kasvufaasis, kui taimedel on arenenud juba 6 pärislehte, sellisel juhul oleks kulunormiks 0,5 l/ha. NB! Kui taimed on väiksemad kui 6 lehte siis vahepealset kulunormi kasutada ei tohi, sellisel juhul peab siiski kasutama normi 0,25 l/ha.



Belkar ja Metazamix-iga töödeldud põld sügisel



Sama põld kevadel



Belkar ja Metazamix-iga töödeldud talirapsi põld enne koristust

BELKAR™ ja METAZAMIX tõrjub peamisi laialehelisi umbrohtusid talirapsis. Segu on kasutamiseks sügisel. Toimib peamiselt läbi lehtede mis on eriti oluline kui sügis on kuiv ja puudub piisav mullaniiskus.

CORTEVA™
agriscience

Ettevõtte Corteva Agriscience ja selle sidusettevõtte kauba- ja teenusemärgid. © 2023 Corteva.

Turustaja:

SCANDAGRA



KEVILI
Põllumajandus OÜ