


Broadway™ Star**HERBITSIID**

Meie panus Teie edusse!



Kevad on kohal ja on aeg mõelda ning teha õiged otsused milliste herbitsiididega kevadel talikultuure pritsida.

Corteva Agriscience™ pakub ühte turul kõige tugevamat lahendust - **Broadway™ Star**, mis hävitab laia valikut ühe- ja kaheidulehelisi umbrohtuid.

Parima tulemuse saavutamiseks pritsitakse **Broadway™ Star segus koos DMA-600-ga 0,5 l/ha ja pindaktiivse märgajaga Dassoil 0,5 l/ha**. Selline lahendus tagab parima katvuse lehtede pinnale nii kahe- kui üheiduleheliste umbrohtude puhul.


- Kasutades kulunormi 200 g/ha hävitab **Broadway™ Star** paljud kaheidulehelised umbrohud ja tülikad üheidulehelised umbrohud nagu **tuulekaer ja rukki-kastehei..**
- Kui pöllul on levinud ka teised üheidulehelised umbrohud, näiteks **rukkiluste, harilik orashein, pöld-rebasesaba, karjamaa-raihein** siis on soovitatav kasutada maksimaalset registreeritud normi **265 g/ha**.
- **Broadway™ Star** sobib pika ja jaheda kevade korral, kuna see on efektiivne ka madalatel õhutemperatuuridel (alates +6 °C).
- Kui kultuuris domineerib rukkilill, on vaja lisada segupartner - DMA-600. **Pöörake tähelepanu õhutemperatuurile. Segus pritsimiseks peab optimaalne temperatuur olema vähemalt +10 °C.**
- Kui õhutemperatuur pole pritsimise ajal jõudnud +10 °C-ni, valige **Broadway™ Stari** juurde mõni muu segupartner – näiteks metüültribenuroon.
- Väga umbrohtunud kultuuride korral on kõige effektiivsem pritsida herbitsiidi kevadel võimalikult varakult, kuni võrsumise lõpuni (**BBCH 29**), enne kui umbrohud pole veel üle kasvanud.
- Sobib pritsimiseks alates võrsumise algusest kuni 2. kõrresõlmeni (**BBCH 21-32**).
- Pärast **Broadway™ Stari** kasutamist võib tavalise külvikorra puhul külvata mis tahes järelkultuuri.
- Peale 1 tunni möödumist pritsimisest ei mõjuta vihm toote efektiivsust.
- Võib pritsida segudes koos paljude teiste taimekaitsevahenditega, sealhulgas ka kasvuregulaatoritega, mille toimeaineiks on kloormekvaatkloriid.

Kahar luste (Bromus sterilis) pritsimisel võib kasutada jaotatud pritsimist (2 pritsimiskorda): jaotatud pritsimine annab kahar luste (Bromus sterilis) suhtes 85-94% tõrjeefektiivsuse.


- Esimene pritsimine: 105 g/ha + märgaja, varakevadel, kui umbrohud on aktiivses kasvufaasis (BBCH 20-29).
- Teine pritsimine: 105 g/ha + märgaja, 10-14 päeva peale esimest pritsimist ja mitte hiljem kui teise kõrresõlme staadiumis (BBCH 32).

Paagisegud Ei tohi segada toodetega, mis sisaldavad **fenoksaprop-p- etüüli** või **kasvuregulaatoreid**, mis sisaldavad **trineksapak- etüüli, mepikvaadi- kloriidi** või **etefoonide** toimeaineid. **Pritsimiste vahel on soovitatav 7-päevane vahe.**

Mitte pritsida kui on vahetult olnud või on oodata öökülmasid!



Rukki kastehei
3 nädalat peale pritsimist



Rukkilill 3 nädalat
peale pritsimist



Roomav madar e. Virn 3
nädalat peale pritmist



Kesalill 3 nädalat
peale pritsimist

		Broadway Star	Broadway Star
		200 g/ha + 0.5 l/ha	265 g/ha + 0.5 l/ha
ARTVU	Harilik puju	xx(x)	xxx
BRSNN – Vol.	Rapsi varis	xxxx	xxxx
CAPBP	Harilik hïirekõrv	xxxx	xxxx
CENCY	Harilik rukkilill	xxx	xxx
CHEAL	Valge hanemalts	xxx	xxxx
CHYSE	Kollane jaanikakar	xx(x)	xxx
CIRAR	Pöldohakas	xx	xx(x)
EROCI	Harilik kurekael	xxx	xxxx
FUMOF	Harilik punand	xxx	xxxx
GAETE	Kare kõrvik	xxx	xxxx
GALAP	Roomav madar	xxxx	xxxx
GERSS	Kurereha	xxx	xxxx
LAMPU	Verev iminõges	xxx	xxxx
MATIN	Kesalill	xxxx	xxxx
MYOAR	Pöld-lõosiilm	xxxx	xxxx
PAPRH	Kukemagun	xxx	xxx
POLAV	Erilehine linnurohi	xxx	xxx
POLCO	Pöldkonnatatar	xxxx	xxxx
SENVU	Harilik ristirohi	xxx	xxxx
SINAR	Pöldsinep	xxxx	xxxx
STEME	Vesihein	xxx	xxx
VERSS	Mailased	xxx	xxxx
VIOAR	Pöldkannike	xxxx	xxxx

		Broadway Star	Broadway Star
		200 g/ha + 0.5 l/ha	265 g/ha + 0.5 l/ha
		Dassoil	Dassoil
AGRRE	Orashein	xxxx	xxxx
ALOMY	Rebase-saba	xxx	xxx
APESV	Rukki-kastehei	xxxx	xxxx
AVEFA	Tuulekaer	xxx	xxx(x)
BROST	Lusted	xxx	xxx
LOLSS	Raihein	xxx	xxx(x)
POAAN	Muru-nurmikas	xx(x)	xx(x)
POATR	Harilik nurmikas	xxxx	xxxx
Volunteer	Odra ja kaera varis	xxx	xxx

Turustaja:


SCANDAGRA

KONTAKTID:

Corteva Agriscience



Priidu Adrijan
+372 58 55 74 73
Priidu.Adrijan@corteva.com



Diana Peedel
+372 51 911 939
Diana.Peedel@corteva.com