

Pixxaro™ EC

Arylex™ active

HERBITSIID



Pixxaro™ EC - töhus lahendus probleemsete kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks teraviljades. Pixxaro™ EC sisaldb kahte toimeainet- uut toimeainet Arylex Active ja juba teada- tundut Fluroksüüpüri, mis tagavad hea efektiivsuse paljude kaheiduleheliste umbrohtude vastu, sealhulgas ALS inhibiitoritele resistentsed ligiid (nt. resistente vesihein). Mõlemad herbitsiidis sisalduvad toimeained kuuluvad sünteetiliste auksiinide rühma (HRAC 4).

Pixxaro™ EC eelised:

- Pixxaro™ EC on herbitsiid, mis on kevadiseks kasutamiseks kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinus, talodras, talirukkis, talitritikales, suvinisu ja suviadoras
- Paindlik kasutusaeg ja kulunorm (taliviljades BBCH 23-45, normiga 0,25 l/ha- 0,5 l/ha; suviviljades BBCH 13-45, normiga 0,125 l/ha- 0,35 l/ha). Kulunormi valikul lähtuda umbrohtude suurusest (suurem umbrohi vajab suuremat normi)
- Toimeaine imendub taime läbi lehtede, seepärast sobib kasutamiseks kõikidel mullatüüpidel ning puuduvad piirangud järelkultuuridele
- Võib segada enami teiste taimekaitsevahenditega
- Ei vaja märgajat, kuna Pixxaro™ EC sisaldb pindaktiivseid aineid
- Vihmakindel juba 1 tund pärast pritsimist
- Kuna Pixxaro™ EC-s sisalduv toimeaine Arylex Active on väga kiiretoimeline, siis tundlikel umbrohuliikidel on visuaalsed sümpтомid nähtavad juba päev pärast pritsimist
- Pixxaro™ EC tõrjub paljusid kaheidulehelisi umbrohtusid, nt roomav madar ehk virn, vesihein, kukemagun, valge hanemalts, harilik punand, verev iminõges ja kare kõrvik
- Tugevaim toode turul resistantse vesiheina tõrjeks



pritsimata



7 päeva
pärast pritsimist



21 päeva
pärast pritsimist


Pixxaro™ EC praktilised näpunäited:

- Pritsimiseks optimaalne temperatuur on vähemalt +10°C
- Ärge pritsige kui on olnud või kui on oodata öökülma

• Pixxaro™ EC efektiivsuse suurendamiseks vähemtundlike kaheiduleheliste umbrohtude vastu nt rukkilill, kesalill, mailaste ligiid, pöldkannike- kasutage paagisegus koos metüül-tribenurooni sisaldava herbitsiidiga nt. Trimmer 50 SG, Granstar Preemia 50 SX, jt

• Optimaalsed kulunormid:

- taliviljad 0,33 l/ha Pixxaro™ EC + 20 g/ha Trimmer 50 SG (toimeaine metüültribenuroon);
- suvinisu ja suvioder 0,25 l/ha Pixxaro™ EC + 15 g/ha Trimmer 50 SG (toimeaine metüültribenuroon)



Pixxaro™ EC efektiivsus maguna tõrjel

KONTAKTID:

Corteva Agriscience

Priidu Adrijan
+372 58 55 74 73
Priidu.Adrijan@corteva.com

Diana Peedel
+372 51 911 939
Diana.Peedel@corteva.com